

**University of Groningen**

## **Klinisch statistisch onderzoek van de resultaten der prostatectomie**

Wymenga, Jan Hendrik

**IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.**

*Document Version*

Publisher's PDF, also known as Version of record

*Publication date:*

1958

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

*Citation for published version (APA):*

Wymenga, J. H. (1958). *Klinisch statistisch onderzoek van de resultaten der prostatectomie*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

### **Copyright**

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

### **Take-down policy**

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

*Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.*

## STELLINGEN

### I

De uraemie, voorkomend bij prostaathypertrophie, kan niet alleen worden verklaard uit de retrograde stuwning.

### II

Een complete of incomplete urineretentie, die eenmaal bij een man poliklinisch is vastgesteld of bepaald, vormt zonder meer geen indicatie tot operatie.

### III

Bij patiënten met asthma cardiale of asthma bronchiale zij men voorzichtig met het toedienen van diuretica resp. adrenaline, wanneer in de anamnese prostatisme voorkomt.

---

### IV

Ter voorkoming van urineretentie na de operatie volgens VAN STOCKUM-MILLIN, verdient het aanbeveling bij een bestaande blaashalssclerose de wigexcisie recht- tot stomphoekig te verrichten.

### V

Bij de fibreuze vorm van blaashalssclerose is een plastiek van de blaashals aangewezen.

### VI

In een aantal gevallen van sphinctersclerose dient medicamenteuze behandeling met antrenyl (duplex) en (of) ergotamine-tartraat te worden overwogen alvorens te besluiten tot operatieve behandeling.

### VII

De waarde van de „SULLIVAN-test” en de „test van MUHSEN” bij de differentiële diagnostiek van het prostaatcarcinoom dient nauwkeurig en kritisch onderzocht te worden.

## VIII

Op grond van de onderzoeken van TRUNNELL, THOMPSON en WERNER en de bevindingen van CARROLL en BRENNAN, verdient het preparaat T.A.C.E. (tri- $\beta$ -anisyl-chloro-ethylene) bij de hormonale behandeling van het prostaatacarcinoom de voorkeur boven ieder ander synthetisch hormoonpreparaat.

## IX

Bij het verloskundig onderwijs aan de Universiteit dienen de phantoomoefeningen te worden gehandhaafd.

## X

De prognose van een in de eerste drie zwangerschapsmaanden voorkomende abortus imminens kan gunstig worden gesteld bij het blijven voortbestaan van emesis.

## XI

Bij de toepassing van bloeddrukverlagende middelen bij zwangerschapsintoxicatie, is het verkrijgen van een betere doorstroming der placenta hoofddoel.

## XII

Op de zuigelingen-consultatiebureaux dient bij ieder kind te worden gezocht naar het symptoom van ORTOLANI.

## XIII

Het mag waarschijnlijk worden geacht, dat de Filistijnse waarzeggers en priester-artsen reeds verband hebben gelegd tussen de heersende muizenplagen en builenpest.

## XIV

De houding van het Oud-Testamentische echtpaar Potifar ten opzichte van de Hebreëer Jozef, laat zich verklaren uit de traditie der Farao's bij het samenstellen der lijfwacht.

STELLINGEN BEHORENDE BIJ  
DE DISSERTATIE VAN J. H. WYMENGA  
GRONINGEN 1958